

Reaktionsgradskalan RLS-85

| | |
|--|--|
| Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad | 1 |
| Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. Tilltal, enstaka tillrop, beröring. | 2 |
| Mycket slö eller oklar Kontaktbar vid kraftig stimulering. Upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering. | 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Föra samtal eller yttra ord • Följa med blicken och fixera • Lyda en uppmaning • Avvärja smärtstimulering |  |
| Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta. | 4 |
| Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta | 5 |
| Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. | 6 |
| Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. | 7 |
| Medvetslös. Ingen smärtreaktion. | 8 |

Definitioner

Vaken: Ej slö, fullt orienterad.

Intuberad patient: Inga tecken på fördröjd reaktion

Slö: Patienten är slö om han/hon känner sig eller medverkar dåligt samt svarar eller reagerar med fördröjd reaktion.

Oklar: Om patienten svarar fel på någon av nedanstående tre frågor är han oklar: a/ "Vad heter du?" (för- och efternamn). b/ "Var är du?" (plats t.ex. stadens namn eller "på sjukhus"). c/ "Vilket år och vilken månad är det nu?".

Kontaktbar: Kan väckas. Patienten kan utföra något av följande: Föra samtal eller yttra ord – följa med blicken – lyda uppmaning – avvärja smärta.

Följa med blicken: ögonöppning med blickkontakt och vid något tillfälle tydligt försök att följa med blicken.

Lyda uppmaning: På uppmaning utför patienten en specifik rörelse t. ex. "lyft armarna", "sträck ut tungan" eller "blunda".

Avvärja smärta: Patienten lokaliserar smärtstimuleringen, griper aktivt och försöker föra bort den.

Medvetslös: Kan ej väckas. Kan inte utföra någon av prestationerna vid kontakthet.

Lokalisera smärta: Patienten undersökes då han ligger på rygg med armarna vilande på underlaget utmed kroppens sidor. a/ Vid smärtstimulering i käkvinkeln för patienten någon hand ovan haknivån eller b/ vid smärtstimulering mot nagelbädden på ena handen för patienten andra handen över medellinjen.

Undandragande rörelse: a/ Vid smärtstimulering i käkvinkeln vrider patienten bort ansiktet eller b/ vid smärtstimulering mot nagelbädden lokaliserar patienten inte smärtan men drar tydligt undan armen från bålen.

Stereotyp böjrörelse: Vid smärtstimulering böjer patienten på ett långsamt mekansikt sätt i armbågen och handleden men kan ej lokalisera eller dra undan.

Stereotyp sträckrörelse: Vid smärtstimulering gör patienten sträckrörelser med armarana eller benen. Om både böj- och sträckrörelser förekommer noteras böjrörelsen dvs bästa svaret gäller.

Ingen smärtreaktion: Patienten rör vare sig armar eller ben eller grimaserar vid smärtstimulering.

